

**INFORMACE PRO CHOVATELE**  
**GABON PA 1,5 mg proužky do úlu k léčení varroázy včel**  
**(určeno ke klinickému hodnocení)**

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A POVOLENÍ K VÝROBĚ**

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.  
Máslovice - Dol 94, 252 66 Libčice n. Vlt.  
tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz



**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Gabon PA 1,5 mg proužky do úlu**

síla 1,5 mg v proužku, léková forma kontaktní proužky, určeno pouze pro včely, léčivá látka acrinathrin.

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Léčivá látka: acrinathrin (1,5 mg v jednom proužku).

Ostatní látky: proužky z gabonové dýhy 150 x 45 x 0,8 mm, kaučuk 5 mg

**4. INDIKACE**

Gabon PA 92 je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách, a to i v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Používá se převážně v podletí a na podzim k ochraně zimujících generací včel. Hubí také včelomorku (Braula coeca).

**5. KONTRAINDIKACE**

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn med určený pro lidský konzum. Jedná se hlavně o med z hlavních snůšek, např. řepka, akát, s medobraním v měsíci červnu.

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

**8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Pro jedno středně silné včelstvo se použijí dva proužky. Má-li včelstvo plod ve více nástavcích, přidá se další jeden až dva proužky. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný přístup k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku o 1 cm rozšíří. Základní expozice je stanovena na dvě periody zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní u dělnického plodu a 30 dní pokud je přítomen trubčí plod. Prodloužení expozice je možné jen v případech pokračujícího spadu roztočů v důsledku reinvaze, a to nejdéle o jednu periodu zavíčkovaného dělnického plodu (12 dní).

Léčivá látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně distribuuje vzájemným kontaktem s kontaminovanými včelami, charakteristickým pro sociální způsob života včel. Roztoči jsou zasaženi při parazitaci kontaminovaných včel. Roztoči parazitující plod v zavíčkovaných buňkách jsou zasaženi až po opuštění buňky spolu s vyhlhlými včelami.

## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Proužky umístíte symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Přípravek působí jen je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek zavěšen, musí se proužek převést do jiné uličky obsazené včelami. Proužky zavěšujte zásadně na háčky ve tvaru háčku, který je jako vzor přiložen ke každému balení. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a nedotýká se plástové plochy. Háček se podle vzoru snadno vyrobí z přiměřeně silného drátu např. kovové kancelářské sponky.

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. Rovněž může dojít k poškození menšího počtu mladušek, pokud setrvají dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva. V případě zvýšeného počtu uhynulých včel snížíme počet proužků. Účinnost Gabonu PA může klesnout při výskytu rezistentních roztočů.

## **10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Med : bez ochranných lhůt.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Zvláštní opatření nejsou nutná. Uchováváme za teploty do 25°C odděleně od potravin a krmiv mimo dosah dětí a nepoulaných osob.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Přípravek obsahuje pyrethroidy. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic a brýlí. Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Při nechtěném kontaktu proužku s kůží zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou. Osoby se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měly vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Při nástupu alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU**

Přípravek obsahuje syntetický pyrethroid acrinathrin, který je toxický pro vodní organizmy. Gabon PA nesmí kontaminovat vodní toky. Použité proužky se likvidují spálením. Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

## **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

15.10.2008

## **15. DALŠÍ INFORMACE**

Doba použití je vyznačena na obalu.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na základě souhlasu příslušné KVS

Balení obsahuje 50 proužků a jeden háček jako vzor. K zápisu výsledků klinického hodnocení slouží „Formulář“, který je spolu s návodem k vyplnění přiložen k léčivu.

Pokud chcete získat další informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto dokumentu.